



MADE IN JAPAN

取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上わからない点や不具合が生じた場合はお確かめください。この取扱説明書を読んでも不明な点については、下記へご連絡ください。

お問い合わせ窓口 不二ライフ株式会社 03-3518-8201 (9:00 ~ 17:00 土日祝除く)

【成分】

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム*・無機塩

*…ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムは、シアヌル酸、水酸化ナトリウム、塩素等から製造され、水に溶解させることで次亜塩素酸を生成します。(化学式 $C_3Cl_2N_3NaO_3 + 3H_2O \rightarrow C_3H_3N_3O_3 + 2HClO + NaOH$)

【注意事項】

- ⚠ 本品やその水溶液を酸・アルカリ系の薬品や洗剤と混ぜないでください。急激に塩素ガス等が発生する危険があります。
- ⚠ 他の塩素系薬品と混ぜないでください。急激に反応し、爆発・発火の危険があります。
- ⚠ 超音波式噴霧器以外の噴霧器では使用しないでください。有害なガス等が発生する危険があります。
- ⚠ 幼児の手の届くところに置かないでください。
- ⚠ 飲み物、食べ物ではありません。用途以外に使用しないで下さい。
- ⚠ 水道水以外と混ぜないでください。
- ⚠ 粉末が金属類（鉄・アルミ・銅等）に付いた場合は水で洗い流してください。腐食することがあります。
- ⚠ 使用中に目がしみたり、気分が悪くなったときはすぐにそこから離れ、よく目を洗い、新鮮な空気のある場所へ移動し、使用を中止してください。
- ⚠ 使用中皮膚に異常が見られた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- ⚠ 使用直後は塩素臭がする場合があります。
- ⚠ 直射日光、湿気を避け、高温の場所に置かないでください。
- ⚠ 水濡れには注意してください。
- ⚠ スプレーボトルで使用する場合は、人に向かってスプレーしないでください。

【応急処置】

- ・ 目に入った場合はすぐに流水で十分洗い流して、眼科医に相談してください。
- ・ 誤って水溶液等を飲んだ場合は、吐かせず口の中をすすぎ水または牛乳を飲ませて、医師の診察を受けてください。
- ・ 粉末を素手で触って異常が感じられる場合は、水で十分に洗浄し、医師の診察を受けてください。

【使用方法】 ご使用できる濃度は以下の2種です

用途	水の量	入れる袋の個数	有効塩素濃度	pH
空間除菌 噴霧器に入れて使用する場合 	4L	2包	35ppm	約 6~7
部分除菌 ボトルに入れて使用する場合 	500ml	1包	140ppm	

- ※ 噴霧器に追加で除菌水を補充したい場合は、2Lの水道水に対しパウダーを1袋入れて作った除菌水を補充してください。
- ※ スプレーに追加で除菌水を補充したい場合は、500mLの水道水に対しパウダーを1袋入れて作った除菌水を補充してください。
- ※ 噴霧器・スプレーに関わらず、規定期間を過ぎて残った溶液は、廃棄して新しいものに作り直してください。
- ※ 除菌水は飲めません。誤って飲んだりしないよう気を付けてください。
- ※ 作った除菌水は、3ヶ月を目安になるべく早く使い切ってください。
- ※ 噴霧器の場合は、濃度が低いため長くても1週間を目安に使い切ってください。
- ※ 上記以外の濃度及び用途で使用しないでください。
- ※ 弊社推奨の噴霧器以外はご使用にならないでください。

【使用例】

動物や植物、食品、電子機器以外のものに使用できます。

用途	形態	濃度	使い方
部屋の除菌	噴霧器	35ppm	噴霧器に所定濃度の除菌水を入れて使用してください。使用時は定期的に換気をおこなってください。(目安12時間おき)噴霧器はこまめにお手入れをおこなってください。
食器類	スプレー	140ppm	洗った食器を所定濃度の除菌水に1~3分つけ置きし、水でよくすすいでください。洗わずに食品などが付いたままつけ置きすると除菌できません。
ソファ衣類	スプレー	140ppm	ご使用前に目立たないところで漂白されないか確認して下さい。50cmほど離れたところからスプレーしてください。
テーブルなど	スプレー	140ppm	表面の汚れを水拭きしてからスプレーしてください。汚れが残ったままだと、除菌効果は著しく低下します。
吐しゃ物の処理	スプレー	140ppm	吐しゃ物に直接触れないようにして汚れを取り除いてください。その後、キッチンペーパーなどを上に敷いて、除菌水を浸して5~10分ほど置いてください。漂白に注意してください。